

Lebosol® Kobber 350 SC

Kultur	Formål	Anbefaling
I alle kulturer	Mod kobbermangel	Bladgødskning 0,25 - 2,0 ltr./ha i 200 - 400 ltr vand. Ved brug af rygsprøjte 0,05 - 0,2 % konc.
Vinterhvede	Vinterhærdning og modstandskraft	0,25 - 0,75 ltr/ha om efteråret 3. bladstadie
	Udbytte, N-effekt, stabilitet og vitalitet	0,25 - 0,75 ltr/ha om foråret fra begyndende vækst
Vårafgrøder	Udbytte, N-effekt, stabilitet og vitalitet	2 x 0,5 - 1 ltr/ha fra 3. bladstadie
Græs	Udbytte, N-effekt, stabilitet og vitalitet	1 - 3 x 0,25 - 0,75 ltr/ha så snart der er tilstrækkelig bladmasse
Bælgfrugter	Bedre kvalitet af bladværk, udbytte, reduktion af binding af kvælstof fra luften	0,25 - 0,75 ltr/ha fra 6. bladstadie
Majs	Bedre kvalitet på bladværk, udbytte	0,25 ltr/ha fra 4. bladstadie

OMRYSTES FØR BRUG!

Blandbarhed:

Lebosol® Kobber 350 SC er blandbar med de fleste plantebeskyttelsesmidler. Da det ikke er muligt at forudsige alle forhold i forbindelse ved brug, anbefales det at lave en mindre blanding og teste blandbarheden før opblanding i sprøjten og behandling i marken. Ved blanding med andre bladdøgninger eller plantebeskyttelsesmidler må der påfyldes 2/3 i tanken og tilføje den produktterne enkeltvis. **Lebosol® Kobber 350 SC skal tilsættes blandingen som sidste komponent og udbringes umiddelbart efter oprøring med omrøring i tanken.**

Opbevaring:

Min. opbevaringstemp.: + 5 °C.

Produktet indeholder dikobberchloridhydroxid, ethandiol, 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-on. Kan give allergisk reaktion.

Faremærkning:

H302+H332 Farlig ved indtagelse og indånding. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Sikkerhedsanvisning:

Forebyggende: P261 - Undgå indånding af sprøjtévæske. P264 - Vask dig grundigt efter brug. P273 - Undgå udledning til miljøet **Reaktion:** P301+312 - VED INDTAGELSE: Hvis du føler dig utilpas ring GIFTINFORMATIONEN eller LÆGE. P304+P340 - VED INDÅNDING: Hurtig ud i frisk luft og forhold dig rolig indtil, dit åndedræt er blevet normalt igen. **Bortskaffelse:** P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i. h. t. kommunale forskrifter

Må kun anvendes ved konstateret behov. De behørigte doseringer må ikke overskrides.



Anvend altid minimum den anbefalede vandmængde for at sikre optimal anvendelse. Undgå spild.

Behandlingsfrist: Min. 2 timer før regn eller anden nedbør. **HUSK: Sprøjtedyr skal rengøres efter brug.**


Holdbarhed: Uåbnet se MHD trykt på dunken

Producent: Lebosol® Dünger GmbH · Wiesengasse 28 · D-67471 Elmstein · Tel.: +49 (0) 63 28/ 9 84 94-0 · www.lebosol.de

Distributør: Azelis Denmark A/S · Lundtoftegårdsvej 95 · DK - 2800 Kgs. Lyngby · Tel. +45 4526 3333 · Fax +45 4593 2833 · www.azelis.com

Azelis Norway AS · Odal Næringshage Stasjonsvegen 16 · NO - 2100 Skarnes · Tlf. +47 90 52 21 02

Bemærk





Cu



EU-GØDNING

Lebosol® Kobber 350 SC

Suspension af Kobberoxychlorid

Kobber 24,2 % (350 gr. Cu/ltr)

Ikke-økologisk produkt, der kan bruges til økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinjerne i Rådsforordning/EU Regulativ nr. 834/2007 og 889/2008.

Må kun anvendes ved konstateret mangel. De behørigte doser må ikke overskrides.

Reg.nr. / Danmark
Reg.nr. / Norge 7933

Distributør:

Azelis Danmark A/S
Lundtoftegårdsvej 95
DK-2800 Kgs.Lyngby
Tel.: +45 4526 3333

Azelis Norway AS
Odal Næringshage Stasjonsvegen 16
NO-2100 Skarnes
Tlf.: +47 90 52 21 02

7,25 kg netto

5 l

Producent:

Lebosol® Dünger GmbH
Wiesengasse 28
D-67471 Elmstein
www.lebosol.de
Tel.: +49 63 28/ 9 84 94-0

