

Front label

PROLINE[®]

Xpert

EC 240

ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. (EUH401).
Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).
Mistænkt for at skade det ufødte barn (H361D).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410). Bemærk: Der dannes et nedbrydningsprodukt (prothioconazol-desthio), som er reproduktionstoksisk i kategori 1B: Kan skade det ufødte barn (H360D).
Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).
Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og ansigtsbeskyttelse (P280).
Beskyttes mod sollys (P410).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, rug, havre, byg og tritcale med og uden udlæg.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Sprøjteforere skal anvende handsker ved blanding og påfyldning.
Må i hvede, rug og tritcale ikke anvendes senere end vækststadium 69.
Må i havre og byg ikke anvendes senere end vækststadium 61.
Udlægget må ikke bruges til foder eller afgræsning.
Må i korn ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SP3).

Forstehjælp: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
Indånding: Bring personen i frisk luft.
Hud: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).
Øjne: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
Fortsæt skylning. (P305+P351+P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).
Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge.
VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).
For at beskytte grundvandet må der højst anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august – 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder mefenfufuconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne ned-sættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstofferne respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne (SPe1).
Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

UFI: V880-S015-100H-AP0K

Virkningsmekanisme
GRUPPE 3 FUNGICIDER

Registreringsindehaver:
Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S
Tlf. 4523 5000
www.cropscience.bayer.dk

Producent:
Bayer AG
D-51368 Leverkusen

Bayer

DK85781758C

LITOTRYK

PMR: DK85781758C

Bayer CropScience DK

Form.: 150x145 mm

Date: 10-01-2022

Artwork: 9820B

Country: DK

Job no.:

Colour: **CMYK**

☐ Use only for corrections

☒ Print Ready PDF for upload to Server

Front page

Etikette nr:
GODKENDT
8. april 2022

for pakninger på 5L
Miljøstyrelsen

Fraugsten, 12.04.22



PROLINE[®]

Xpert

EC 240

5 liter



DK85806289C

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, rug, havre, byg og tritcale med og uden udlæg.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Reg.nr. 18-666

Svampemiddel nr. 18-666
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmidler forordningen 1107/2009.

Analyse
 prothioconazol 160 g/l (16,6% w/w)
 tebuconazol 80 g/l (8,5% w/w)

Netto 5 liter
Flydende
Midlet er et emulgerbart koncentrat

Fab.nr.: påtrykt emballagen
 Produktet er ved korrekt opbevaring og uåbnet emballage holdbart i mindst 2 år efter produktionsdatoen. Produktionsdato påtrykt emballagen.

Producent:
 Bayer AG
 D-51368 Leverkusen

Registreringsindehaver:
 Bayer A/S
 Arne Jacobsens Allé 13
 DK-2300 København S
 Tlf. 4523 5000
www.cropscience.bayer.dk



51 705628 667301

UN 3082



LITOTRYK	PMR: DK85806289C Bayer CropScience DK		
	Form.: 150x145 mm	Date: 31-03-2022	☐ Use only for corrections
	Artwork: 9821A	Country: DK	☒ Print Ready PDF for upload to Server
	Job no.:	Colour: CMYK	

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. (EUH401).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Mistænkt for at skade det ufødte barn (H361d).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410). Bemærk: Der dannes et nedbrydningsprodukt (prothioconazol-desthio), som er reproduktionstoksisk i kategori 1B: Kan skade det ufødte barn (H360d).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og ansigtsbeskyttelse (P280).

Beskyttes mod sollys (P410).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, rug, havre, byg og tritcale med og uden udlæg.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Sprøjteforere skal anvende handsker ved blanding og påfyldning.

Må i hvede, rug og tritcale ikke anvendes senere end vækststadium 69.

Må i havre og byg ikke anvendes senere end vækststadium 61.

Udlægget må ikke bruges til foder eller afgræsning. Må i korn ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SP3).

Førstehjælp

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

Indånding: Bring personen i frisk luft.

Hud: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).

Øjne: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august – 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder mefentrifluconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstofferenes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne (SPe1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



UFI: V880-S015-100H-AP0K

Virkningsmekanisme

GRUPPE 3 FUNGICIDER

BRUGSANVISNING**ANVENDELSESOMRÅDE**

Proline® Xpert EC 240 er et bredtvirkende svampemiddel til bekæmpelse af sygdomme i hvede, byg, havre, rug samt tritcale med og uden udlæg.

VIRKEMÅDE

Proline Xpert EC 240 består af to aktivstoffer, begge fra gruppen af triazoler: Prothioconazol og Tebuconazol. Kombinationen af de to virkstoffe betyder, at Proline Xpert EC 240 virker både forebyggende og kurativt mod en række svampesygdomme. Begge stoffer virker systemisk og fordeles i bladene med saftstrømmen. Den bedste effekt opnås ved at foretage behandling på et tidligt tidspunkt i svampens udviklingsstadium. Proline Xpert EC 240 bør anvendes ved begyndende angreb eller efter udslag fra prognosemodeller baseret på risikovurdering.

EFFEKTABEL

Når Proline Xpert EC 240 anvendes på optimale behandlingstidspunkter og med optimale doseringer kan der opnås nedenstående effektniveauer i de respektive afgrøder.

Hvede, rug og tritcale	Sygdomseffekt på tidlige vækststadier (BBCH 30-32)	Sygdomseffekt på sene vækststadier (BBCH 33-69)
Hvede med og uden udlæg	God effekt: Gulrust, brunrust, meldug*	God effekt: Gulrust, brunrust, meldug* Moderat effekt: Hvedebladplet (DTR) Op til moderat effekt: <i>Septoria</i> (hvedegråplet og hvedebrunplet), aksfusarium
Rug med og uden udlæg	God effekt: Skoldplet, Meldug*	God effekt: Brunrust, skoldplet, meldug*
Tritcale med og uden udlæg	God effekt: Skoldplet, Meldug*	God effekt: Gulrust, brunrust, skoldplet, meldug* Op til moderat effekt: Brunplet
Byg og havre	Sygdomseffekt på tidlige vækststadier (BBCH 30-32)	Sygdomseffekt på sene vækststadier (BBCH 33-61)
Byg med og uden udlæg	God effekt: Skoldplet, Meldug*	God effekt: Bygrust, skoldplet, meldug* Moderat effekt: Bygbladplet Reduktion: <i>Ramularia</i>
Havre med og uden udlæg	God effekt: Meldug*	God effekt: Krønrust, havrebladplet, meldug*

God effekt (>75%); Moderat effekt (50-75%); Reduktion (25-50%)

*Effekten på meldug afhænger af, om der sprøjtes forebyggende eller kurativt. Ved sprøjtning på etablerede angreb kan kun forventes moderat effekt.

GENERELT

Hvis Proline Xpert EC 240 blandes eller anvendes i sekvens med andre produkter, der indeholder tebuconazol, difenoconazol eller mefentrifluconazol skal der tages højde for, at den totale mængde aktivstof ikke må overskride, hvad der svarer til 1 normaldosering (1 N) per sæson. 1 N er afhængig af vækststadiet (BBCH).

Tabellen angiver, hvad normaldoseringen (1 N=100%) for de forskellige vækststadier er for de tre aktivstoffer. Hvis man f.eks. bruger 0,75 l Proline Xpert EC 240 per hektar (= 60 g tebuconazol/ha) i vinterhvede bejdset med tebuconazol i BBCH 42, svarer dette til 29% af tebuconazols normaldosering i vækststadiet BBCH 38-69 (210 g). Man har derefter mulighed for yderligere at bruge 71% af de nævnte aktivstoffer i tabellen. Sæsonen går fra såning til høst.

Blandingstabel vintersæd:

Aktivstof	Vintersæd, bejdset med tebuconazol eller difenoconazol	Vintersæd, ikke bejdset med tebuconazol eller difenoconazol
Difenoconazol BBCH 33-69	125 (=100%)	125 (=100%)
Tebuconazol BBCH 30-32	50 (=100%)	67 (=100%)
Tebuconazol BBCH 33-37	100 (=100%)	133 (=100%)
Tebuconazol BBCH 38-69	210 (=100%)	250 (=100%)
Mefentrifluconazol BBCH 33-37	100 (=100%)	100 (=100%)
Mefentrifluconazol BBCH 38-40	150 (=100%)	150 (=100%)

Blandingstabel vårsæd

Aktivstof	Vårsæd, bejdset med tebuconazol eller difenoconazol	Vårsæd, ikke bejdset med tebuconazol eller difenoconazol
Difenoconazol BBCH 33-69	125 (=100%)	125 (=100%)
Tebuconazol BBCH 30-32	53.5 (=100%)	67 (=100%)
Tebuconazol BBCH 33-48	85 (=100%)	107 (=100%)
Tebuconazol BBCH 49-69	128 (=100%)	161 (=100%)
Mefentrifluconazol BBCH 33-37	100 (=100%)	100 (=100%)
Mefentrifluconazol BBCH 38-40	150 (=100%)	150 (=100%)

DOSERING**GENERELT OM DOSERING**

Nedenstående tabeller viser de maksimalt mulige doseringer af Proline Xpert EC 240 pr. afgrøde og vækststadie. Det er tilladt at bruge 2 behandlinger i både vinter- og vårsæd, når den samlede dosering ikke overskrider 1 N eller nedennævnte max. doseringer pr. behandling.

Hvis man bruger hele den angivne dosering på et givet BBCH, må man ikke bruge mere på et senere tidspunkt. Hvis man bruger mindre end de nedenfor angivne doseringer, så er der mulighed for at følge op med endnu en behandling med Proline Xpert EC 240. De mulige doseringer beregnes v.h.a. blandingstabellerne ovenfor.

Hvis produktet ønskes anvendt i en strategi med flere behandlinger eller i kombination med andre produkter indeholdende tebuconazol, difenoconazol eller mefentrifluconazol, skal nedennævnte doser reduceres, således at der for hele behandlingsprogrammet maksimalt anvendes en mængde svarende til 1 normaldosering jf. blandingstabellerne.

KORN – DOSERING OG ANVENDELSE**Vintersæd, maximal doseringer**

Vækststadie	Bejdset med tebuconazol eller difenoconazol. Der kan anvendes op til	Ikke bejdset med tebuconazol eller difenoconazol. Der kan anvendes op til
BBCH 30-32	0,625 l/ha eller	0,83 l/ha dog max 0,75 l/ha pr. behandling eller
BBCH 33-37	1,25 l/ha dog max 0,75 l/ha pr. behandling eller	1,5 l/ha dog max 0,75 l/ha pr. behandling eller
BBCH 38-61*	1,5 l/ha dog max 0,75 l/ha pr. behandling	1,5 l/ha dog max 0,75 l/ha pr. behandling

* Vinterhvede, rug og triticales må behandles indtil BBCH 69.

Vårsæd, maximal doseringer

Vækststadie	Bejdset med tebuconazol eller difenoconazol. Der kan anvendes op til	Ikke bejdset med tebuconazol eller difenoconazol. Der kan anvendes op til
BBCH 30-32	0,66 l/ha eller	0,83 l/ha dog max 0,75 l/ha pr. behandling eller
BBCH 33-48	1,06 l/ha dog max 0,75 l/ha pr. behandling eller	1,33 l/ha dog max 0,75 l/ha pr. behandling eller
BBCH 49-61*	1,5 l/ha dog maks. 0,75 l/ha pr. behandling	1,5 l/ha dog max 0,75 l/ha pr. behandling

* Vårhvede må behandles indtil BBCH 69

Maksimalt 2 behandlinger i korn, hvis valgte dosering og vækststadiet gør dette muligt, jævnfør blandingstabellen for vårsæd eller vintersæd ovenfor. Husk at tage højde for om såsæden er bejdset med tebuconazol eller difenoconazol. Maximal dosis pr. behandling er 0,75 l/ha. Ved 2 behandlinger med Proline Xpert EC 240 i samme afgrøde skal der minimum gå 14 dage mellem behandlingerne.

Proline Xpert EC 240 kan anvendes mod følgende sygdomme i de forskellige kornarter:

Hvede: Mod meldug, gulrust og brunrust behandles, når de første sygdomstegn viser sig i marken. Mod hvede-brunplet og hvedegråplet (Septoria) behandles efter risikovurdering eventuelt ved begyndende angreb. For at opnå beskyttelse af de øverste blade og akset, behandles fra vækststadiet 37 frem til vækststadiet 69. Mod hvedebladplet behandles ved de første sygdomstegn. Behov for tidlig behandling i foråret kan navnlig opstå i hvedesædskeer med reduceret jordbehandling.

Mod aksfusarium vil det optimale tidspunkt for behandling være mellem begyndende blomstring st. 61 og afsluttet blomstring st. 69. Der kan forventes moderat effekt. Bekæmpelse af aksfusarium kan bl.a. nedsætte dannelsen af mycotoxiner.

Byg: Mod bygrust, bygbladplet, meldug, skoldplet og ramularia sprøjtes ved begyndende angreb eller efter varsling.

Havre: Mod meldug og kronrust sprøjtes ved begyndende angreb eller efter varsling.

Rug: Mod meldug, rust og skoldplet behandles ved begyndende angreb eller efter varsling.

Triticale: Mod meldug, rust, hvedebrunplet og skoldplet behandles ved begyndende angreb eller efter varsling.

OPTIMALE BETINGELSER

Proline Xpert EC 240 bør anvendes når afgrøden er i vækst og temperaturen er mindst 6°C. Sørg for mindst 1 times tørvejr efter behandlingen. Behandling på saftspændte planter giver den hurtigste optagelse og den bedste fordeling i planterne.

RESISTENSUDVIKLING

Aktivstof	Gruppe	FRAC	Virkningsmekanisme	Risiko for resistens
Prothioconazol	triazol	3	Blokerer svampens ergosterol-biosyntese	moderat
Tebuconazol	triazol	3	Blokerer svampens ergosterol-biosyntese	moderat

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum.

For at mindske risikoen for resistensudvikling bør produkter, der indeholder det samme aktivstof maksimalt anvendes 2 gange pr. sæson. Det kan ikke udelukkes, at svampe udvikler nedsat følsomhed over for Proline Xpert EC 240. Sælger kan ikke drages til ansvar for manglende effekt ved en evt. nedsat følsomhed.

PRODUKTMÆSSIGE BEGRÆNSNINGER

- Virkningsperioden for Proline Xpert EC 240 afhænger af forhold som behandlingstidspunkt, dosering, afgrødens udviklingsstadium og væksthastighed, infektionstryk samt klima.
- Undgå sprøjtning under ekstreme vejrforhold, f.eks. tørke med stærkt solskin og temperatur over 25°C.

FYSISK BLANDBARHED

Proline Xpert EC 240 kan blandes med relevante midler samt med mangansulfat af god kvalitet. Følg altid etikettens anvisninger for blandingspartnere. Ved blandbarhed med andre produkter testes der ikke for eventuelle afgrødeskader, nedsat effekt eller andre påvirkninger af afgrøden. Se hjemmesiden [www.cropscience.bayer.dk](http://www.cropsscience.bayer.dk) for en oversigt over fysisk testede kombinationer eller kontakt din lokale konsulent.

SPRØJTETEKNIK

Proline Xpert EC 240 skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr. Der benyttes 100 - 300 l vand/ha. Ved behandling af tætte afgrøder kan vandmængden øges og kørehastigheden sænkes for at forbedre nedtrængning af sprøjtevæsken i afgrøden.

Vejledende angivelse af væskemængde, dysevalg, tryk og kørehastighed.

Afgrøde	Dysenr.	Tryk,	bar Km/t	Vand, l/ha
Åben/lav	ISO 110-02 (gul)	3	8,0	120
Tæt/ høj	ISO 110-04 (rød)	3	6,4	300

TILBEREDNING AF SPRØJTEVÆSKE

Anvend en rengjort sprøjte. Proline Xpert EC 240 tilsættes i sprøjtens fyldeudstyr samtidig med vandpåfyldning og omrøring. Ved tankblanding bør det først tilsatte middel være væk fra fyldeudstyret inden næste middel tilsættes. Foretag konstant omrøring af sprøjtevæsken under transport og udsprøjtning. Ved håndtering af plantebeskyttelsesmidler anvendes personligt beskyttelsesudstyr, såsom egnede handsker og briller.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtavæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtavæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.

OPBEVARING

Bør opbevares køligt og frostfrit.

RESTER OG TOM EMBALLAGE

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

PRODUKTANSVAR

Bayer A/S fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet. Brugsanvisning og anbefalinger er baseret på forsøg udført i overensstemmelse med GAP (Good Agricultural Practices). Vejr, jordforhold, sorter, dyrkningsteknik, resistens eller blandinger med andre produkter kan resultere i, at produktet ikke giver den ønskede effekt eller sågar skader afgrøden. Bayer A/S er ikke ansvarlig for omkostninger, tab eller skade som følge af sådanne forhold.

3.2022

UN 3082



® is a registered trademark of the Bayer Group

Svampemiddel nr. 18-666
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse
prothioconazol 160 g/l (16,6% w/w)
tebuconazol 80 g/l (8,5% w/w)

Netto 5 liter
Flydende
Midlet er et emulgerbart koncentrat

Fabrn.: påtrykt emballagen
Produktet er ved korrekt opbevaring og uåbnet emballage holdbart i
mindst 2 år efter produktionsdatoen, Produktionsdato påtrykt embal-
lagen.

Producent:
Bayer AG
D-51368 Leverkusen

Registreringsindehaver:
Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S
Tlf. 4523 5000
www.cropscience.bayer.dk

Bayer

Base page



PROLINE[®]

Xpert

EC 240

5 liter

Svampemiddel
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, rug, havre, byg og tritcale med og uden udlæg.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Reg.nr. 18-666

Svampemiddel nr. 18-666
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmidler forordningen 1107/2009.

Analyse
prothioconazol 160 g/l (16,6% w/w)
tebuconazol 80 g/l (8,5% w/w)

Netto 5 liter
Flydende
Midlet er et emulgerbart koncentrat
Fabr.nr.: påtrykt emballagen
Produktet er ved korrekt opbevaring og uåbnet emballage holdbart i mindst 2 år efter produktionsdatoen. Produktionsdato påtrykt emballagen.

Producent:
Bayer AG
D-51368 Leverkusen

Registreringsindehaver:
Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S
Tlf. 4523 5000
www.cropscience.bayer.dk

Bayer

UN 3082

51 705628 667301

DK85806289C