

Difcor®250



SVAMPEMIDDEL

► **Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler og pærer.**

- Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
- Analyse: Difenconazol 250 g/l (23,6 % w/w)
Indeholder aromatiske karbonhydrider
- Midlet er et emulgerbart koncentrat.
- Svampemiddel nr. 613-28

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

- Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som sammen med batchnummer findes stemplet på emballagen.
Produktionsdato: Se andet sted på emballagen.

SALG OG RÅDGIVNING:



NORDISK ALKALI
Anemonevænget 2, 4330 Hvalso
Tlf. 4649 1171
www.nordiskalkali.dk

INDHOLD: **1L** e

REGISTRERINGSINDEHAVER:

GLOBACHEM NV
Brustem Industriepark
Lichtenberglaan 2019,
3800 Sint-Truiden
Belgien
Tlf +32 (0)11 78 57 17
www.globachem.com



Difcor®250

SVAMPEMIDDEL

- Analyse: Difenconazol 250 g/l (23,6 % w/w)
Indeholder aromatiske karbonhydrider

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Farlig ved indtagelse (H302).

Kan være livsfarlig, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270).

Bær beskyttelseshandsker/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må ikke anvendes for begyndende blomstring / BBCH 60.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler og pærer og ikke senere end 14 dage før høst.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder mefentrifluconazol, tebuconazol eller difenconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstofferne respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne (SPe1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).


I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.

Fremkald IKKE opkastning (P301+P310+P331).

VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let (P305 + P351 + P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337 + P313).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.

UF: WC00-509Q-400N-GX5A



* = Reg. varemærke for GLOBACHEM NV



ET17972_ED1-V1



DK



BRUGSANVISNING

Difcor® 250 er et kontakt- og systemisk virkende middel som anvendes fra begyndende blomstring (BBCH 60) og frem til 14 dage før høst. Effekten er først og fremmest kurativ (helbredende), mens den forebyggende effekt er mere moderat.

ANVENDELSE:

Afgrøde	Skadevolder	Maksimal dosering	Behandlingstidspunkt	Bemærkninger
Æble Pære	<i>Venturia inaequalis</i> : æbleskurv <i>Venturia pyrina</i> : pæreskurv	2 x 0.15 l/ha	Fra begyndende blomstring til 14 dage før høst	Minimum 7 dage mellem behandlinger

VIRKNING

Difcor® 250 virker først og fremmest kurativ og har fuld virkning i 48 timer efter en infektionsperiode (følg varslingsystemerne og situationen i plantagen meget nøje). Der er effekt frem til 4 døgn efter infektion, men de sidste to døgn kan virkningen være reduceret. Høj temperatur fremmer effekten.

Der vil typisk være størst behov for Difcor® 250 i maj-juni når ascosporer er modne og kan udslynges under fugtige forhold, men i sorter med sen skudtilvækst kan det også være aktuelt med behandling senere på sæsonen (husk sprøjtefrist). Den præventive (forebyggende) virkning er ikke tilstrækkelig. Her skal der evt. blandes med et virksomt produkt med gode præventive egenskaber.

OPTIMALE VIRKNINGSFORHOLD

Temperaturen skal være over 12 grader for at opnå gode virkningsforhold. Ved temperatur over 16 grader vil indtrængning og virkning være ekstra hurtig. Bedst virkning opnås ved behandling på træer i god vækst med lagttagelse af god dækning af sprøjtevæsken. Difcor® 250 er regnfast efter 2 timer.

SPRØJTETEKNIK

Udbringes med tågesprøjte. Vandmængde typisk 200-400 l pr. ha.
Der vælges en dyse- og luftkombination som afsætter mest mulig væske på blade og frugter.

NYTTEINSEKTER

Difcor® 250 er fundet skånsom mod følgende nyttedyr: Æblerovmide (*Typhlodromus pyri*), snylteheps (*Aphidius rhopalosiphii*), rovtæge (*Orius laevigatus*) og guldøje (*Chrysoperla carnea*). Foreneligheden med anvendelse af øvrige nyttedyr er ukendt.

RESISTENS

Aktivstoffet difenoconazol er en triazol (FRAC gruppe 3), hvor risikoen for udvikling af resistens vurderes at være medium. FRAC oplyser, at der på verdensplan er fundet resistens over for skurv. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle sygdomme.

OPBLANDING:

Fyld tanken halvt op med vand, tilsæt den ønskede mængde Difcor® 250 og tilsæt efterfølgende den resterende vandmængde under omrøring. Udsprøjtes direkte efter opblanding. Blandingspartner på fast form (pulver eller granulat) tilsættes før Difcor® 250, flydende blandingspartnere efter Difcor® 250. Klargør ikke mere sprøjtevæske end der skal bruges umiddelbart. Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling. Restsprøjtevæske fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den behandlede afgrøde. Det er vigtigt at rengøre sprøjtestyret grundigt efter brug. Husk vask med rengøringsmiddel ud- og indvendigt og flere gange skylning af alle indvendige dele. For yderligere regler vedrørende fyldning, tørring og rengøring af sprøjtestyret henvises til Bekendtgørelse 1401 af 26. november 2018 eller eventuel senere udgave.

OPBEVARING

Opbevares tørt og køligt, men frostfrit.

BORTSKAFFELSE

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.