

Kani-Stopp

Fodertilskud til forebyggelse af kannibalisme hos svin

Produktanvendelse

1. Kani-Stopp tildeles i krybbe eller på gulv med 5-10 g pr. dyr pr. dag, eller i fuldfoder med 5 kg pr. tons.
2. Kani-Stopp anvendes forebyggende ved stressbelastning af grisene, f.eks. ved flytning, foderskift eller lignende i 5-10 dage, startende ca. 3 dage før belastningen.
3. Kani-Stopp anvendes ved akut opstået kannibalisme i 5-10 dage eller indtil kannibalsmen ophører. Andre samtidige tiltag anbefales.

Produktorientering

1. Kani-Stopp er et hvidt/svagt gulligt pulver, der tildeles tørt eller iblandes foder.
2. Kani-Stopp indeholder udvalgte mineraler, der er kendt for en beroligende effekt.
3. Kani-Stopp indeholder fibre og udtræk af urter. Fibre kan være medvirkende til at stimulere tarmfunktionen og forbedre gødningskonsistensen.

**Vitfoss**

Kani-Stopp

Fodertilskud til forebyggelse af kannibalisme hos svin

Indholdsgaranti:

6,40 % Natrium
8,60 % Magnesium

Sammensætning:

Magnesiumacetat
Glukose
Natriumklorid
Magnesiumoxyd
Sojabønner (ristede genmodificerede)
Natriumbikarbonat
Fint hvedeklid

Tilsætningsstoffer pr. kg**Ernæringsmæssige:**

18.200 mg DL-alfa-tokeferol *)
60.845 mg Jern-(II)-sulfat, mono-hydrat (E1)

Teknologisk:

Citronsyre (E 330)

*) 20.000 I:E. E-vitamin, som E-vitaminpræparat

Brugsanvisning:

Dette tilskudsfoder må kun anvendes med indtil 0,5% af det daglige foder på grund af tilskudsfoderets forhøjede indhold af jern.

Anbefaling:

For at opnå en ønsket effekt skal Kani-Stopp gives i 5 dage efter hinanden med 5-10 g pr. dyr pr. dag henholdsvis blandet med 5 kg/t foder.

Det er bedst at starte med tildelingen 2-3 dage før belastningen, hvis muligt.

Holdbarhed:

Fremstillet 4 måneder før dato for mindste holdbarhed.
Opbevares koldt og tørt.

Pakningsstørrelse:

25 kg