



YoghurLac

Syrnet, energirigt tilskudsfoder med mælkesyrebakterier til smågrise

Produktanvendelse

1. Diegivningsperioden:

Til smågrise i den første leveuge, hvor YoghurLac tildeles til:

- Store kuld, hvor soen skal passe mange grise
- Kuld, hvor soen ikke giver tilstrækkeligt meget mælk (MMA)
- Kuld, hvor der er risiko for diarré og tarmforstyrrelser
- Kuld med små og svage grise

Her anvendes YoghurLac i 4-5 dage, hvor hvert kuld vil konsumere ca. 1 kg YoghurLac-pulver (ca. 9 liter yoghurt).

2. Efter fravæning:

- Til frasorterede "skravlgrise" - tildeling i 8-12 dage
- Til kuld med diarré - tildeling i 3-5 dage
- Til kuld, der har fået antibiotikabehandling - tildeling i 3 dage.

3. Indkøbte 7 kgs grise:

- I de første 3 dage blandes 8 kg foder, 200 gram YoghurLac (2 målebægere med top) og 3 liter vand, som tildeles i langtrug, og ALLE grise vil æde fra dag 1. Vigtigt, at alle grise æder hurtigst muligt efter indsættelse. Ved siden af tildeles tørfoder i automat.

Produktorientering

1. Mælkepulver, som tilfører letoptagelige næringsstoffer og giver en god smag.

2. Mælkesyrebakterier, som bidrager til stabilisering af hele grisens tarmsystem.

3. Citronsyre, som giver en frisk smag og sikrer lavt pH til hæmning af E-Coli m. fl.

4. Glukose, som er en effektiv og letomsættelig energikilde.

5. Elektrolytter, som giver en optimal salt- og væskebalance i tarmsystemet.



Vitfoss

YoghurLac

Syrnet, energirigt tilskudsfoder med mælkesyrebakterier
til smågrise

Analytiske bestanddele:

9,00 % Råprotein
9,90 % Råfedt
5,50 % Råaske
0,40 % Træstof
1,15 % Natrium
0,50 % Kalium
1,80 % Klorider
7,50 g Lysin g/kg
2,20 g Methionin g/kg

Sammensætning :

Mælkepulver
Vallepulver
Tørrede planteprodukter
Glukose
Skummetmælkspulver
Tørfedt
Natriumklorid

Tilsætningsstoffer:

Ernæringsmæssige:

50.000 mg pr. kg citronsyre

Fordøjelsesfremmende:

Mælkesyrebakterier 1,5 10⁹ CFU/kg
(Enterococcus Faecium DSM 10663 NCIMB 10415)

Brugsanvisning:

Diegivningsperioden:

125 gram YoghurLac blandes i 1 liter lunkent vand, og der omrøres med piskeris.
Målebæger til 125 gram YoghurLac er vedlagt i spanden.
Tildeles ad libitum. Tildeles to gange dagligt. Skåle og trug rengøres dagligt.

Efter fravænning:

125 gram YoghurLac blandes i 2 liter lunkent vand, og som tildeles i langtrug, så der er ædeplads til alle grise i 8-12 dage efter fravænning. Tørfoderet hældes i truget først og så YoghurLac ovenpå, som lokkemad.

Indkøbte 7 kgs grise:

I de første 3 dage blandes 8 kg foder, 200 gram YoghurLac (2 målebægere med top) og 3 liter vand. Tildeles i langtrug, og ALLE grise vil æde fra dag 1. Vigtigt, at alle grise æder hurtigst muligt efter indsættelse. Ved siden af tildeles tørfoder i automat.

Anvendes med maksimalt 15 gram pr. gris dagligt.

Holdbarhed:

24 måneder
Opbevares tørt og køligt

Pakningsstørrelse:

15 kg