

# Correct-Calcipro®

Diætetisk tilskudsfoder til malkekøer

## Produktanvendelse

- 1. Correct-Calcipro® indgives gennem munden med en doseringspistol (fugepistol).**  
*- Nem og sikker dosering.*
- 2. Correct-Calcipro® gives til køer i risikogruppen.**  
*Kælvningsfeber forekommer næsten aldrig hos kvier og sjældent hos 2. kalvs køer. Sygdomsrisikoen stiger stærkt efter 3. kalv.*
- 3. Har koen først fået kælvningsfeber, skal dyrlægen altid tilkaldes.**  
*Det er bedre at forebygge end at helbrede.*

## Produktorientering

- 1. Correct-Calcipro® er et calciumprodukt i pastaform til mindskelse af risikoen for kælvningsfeber hos køer.**  
*Kælvningsfeber kan forekomme i de første døgn efter kælvningen og forløber som en fremadskridende lammelse, der uden behandling fører til koens død. Årsagen hertil er et stærkt fald i blodets indhold af calcium.*
- 2. Correct-Calcipro® indeholder calciumpropionat, calciumklorid og dicalciumfosfat som calciumkilder.**  
*Dette har indvirkning på blodets indhold af calcium.*
- 3. Correct-Calcipro® fås i pakninger med 12 tuber.**  
*Passer til en forebyggende behandling af en ko.*

**Vitfoss**

# Correct-Calcipro®

Diætetisk tilskudsfoder til malkekøer

---

**Egenskaber:**

Særligt ernæringsmæssigt formål: Mindskelse af risikoen for mælkefeber.

---

**Sammensætning:**

Calciumpropionat 31,5% (6,8% calcium),  
calciumklorid 8,2% (2,97% calcium),  
dicalciumfosfat 2,6% (0,6% calcium),  
magnesiumoxyd, propan-1,2-diol.  
Totalt calciumindhold: 11,4%

**Analytiske bestanddele:**

0,3 % Råprotein  
0,5 % Cellulose  
1,0 % Råfedt  
29,5 % Råske  
10,4 % Calcium  
0,6 % Magnesium  
0,5 % Fosfor  
<0,32 % Natrium  
52,0 % Vand

---

**Brugsanvisning:**

Det anbefales at konsultere en dyrlæge inden anvendelse af foderet.

Correct-Calcipro indgives på følgende måde:

- 1) Skær yderste spids af tuben med kniv/tang.
- 2) Påskru vedlagte engangsspids.
- 3) Anbring tuben i Correct doseringspistolen.
- 4) Tag fat i dyrets mundvig med den frie hånd.
- 5) Indfør tuben i munden parallelt med tungen.
- 6) Tøm tuben i takt med dyrets synkebevægelser\*, når doseringspistolens håndtag er ud for fortænderne.

\*kun dyr med normal synkereflex må behandles.

**Dosering:**

Som calciumtilskud

- 1) 1 tube Correct-Calcipro når koen lægger an til kælvning (typisk 2-6 timer før kælvning)
- 2) 1 tube Correct-Calcipro 8-12 timer efter første tube

Som supplement ved behandling af mælkefeber

- 1) 1 tube Correct-Calcipro 2-4 timer efter dyrlægens behandling
  - 2) 1 tube Correct-Calcipro 8-12 timer efter første tube
- 

**Holdbarhed:**

Se pakning

**Pakningsstørrelse:**

Pakninger med 12 tuber à 340 g nettovægt.