

Paco Start 19

Fuldfoder til legekylinger Anvendes indtil 8 uger

Analytiske bestanddele:

Råprotein	18,5	%
Råfedt	3,3	%
Træstof	4,0	%
Råaske	5,5	%
Lysin	10,0	g/kg
Methionin	4,1	g/kg
Cystin	3,2	g/kg
Calcium, g	10,0	g/kg
Fosfor	5,5	g/kg
Natrium, g	1,6	g/kg
Zink	105	mg/kg

Tilsætningsstoffer, tilsat pr. kg:

Ernæringsmæssige:		
Fe, jern-(II)-sulfat monohydrat (3b103)	50	mg
Cu, kobber(II)sulfat, pentahydrat (3b405)	15	mg
Mn, Mangan-(II)-oxid (3b502)	100	mg
Zn, Zinkoxid (3b603)	75	mg
I, Calciumjodat, vandfrit (3b202)	1,00	mg
Se, natriumselenit (3b801)	0,30	mg
A-Vitamin (3a672a)	10000	i.e.
Cholinklorid (3a890)	300,00	mg
D3-vitamin (3a671)	3000	i.e.
E-Vit., all-rac-alpha-tocopherylacet.(3a700)	35	i.e.
L-Lysinsulfat og biprodukter heraf (EC3.2.5)	0,8	g
DL-Methionin, teknisk rent (3c201)	1,4	g
Teknologiske:		
BHT (E321)	2,00	mg
Propylgallat, (E310)	2,00	mg
Citronsyre, (E330)	0,99	mg
Zootekniske:		
6-phytase, EC 3.1.3.26 (E4a24)	480	enh.
Endo-1,3(4)-Betaglucanase, EC 3.2.1.6 (E4a15)	69	enh.
Endo-1,4-betaglucanase, EC 3.2.1.4	80	enh.
Endo-1,4-Beta-Xylanase, EC 3.2.1.8 (E4a11)	270	enh.

Eksempel på sammensætning:

Hvede
230: Sojaskråfoder, afsk.
Havre
Majs
Hvede hel
Byg
Calciumkarbonat (kridt)
Solsikkeskråfoder, afskallet
Monocalciumfosfat
Veg. olie og fedtstof, soja
65: FjerVit
Natriumbikarbonat
Stensalt
L-Lysinsulphat
DL-Methionin
Cholinchlorid, 50 %
Fytaseenzym, EC3.1.3.26 (E4a24)

Denne foderblanding kan indeholde spor af fiskemel og må derfor ikke anvendes til drøvtyggere. Denne foderblanding indeholder cholinklorid og samtidig tilsætning af cholinklorid til drikkevand bør undgås.

65: Premix'en er tilsat antioxydanter og tilfører blandingen de under garantien anførte mængder mikromineraler og vitaminer samt enzym: endo-1,4-beta-glucanase, endo-1,3,(4)-beta-glucanase og endo-1,4-beta-xylanase. 4a1602i.

230: Fremstillet af genetisk modificerede sojabønner.