

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Kan forårsage langvarig og diffus forurening af vandressourcer (EUH450).

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud (EUH066).

Undgå indånding af spray (P261).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Bær øjenbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps.

Brugsanvisningens angivelser skal overholdes.

Sprøjteførere skal anvende kemisk bestandige handsker ved blanding og påfyldning.

For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder clopyralid kun anvendes hvert 4. år på samme areal (SPe1).

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Midlet må kun opbevares i originalemballagen.



Førstehjælp

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352)

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN eller en læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312)

VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til GIFTLINJEN eller en læge (P305+P351+P338).

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313)



Korvetto™
Arylex™ active

Etiket nr.: IV
GODKENDT

11. juni 2026

for pakninger på
Miljøstyrelsen

3 L

W. de Bordes

UKRUDTSMIDDEL

GROUP

4

FUNGICIDE

UFI: PFN9-NOW6-X00X-XUX9

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Ukrudtsmiddel nr. 64-93

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse:

Halauxifen-methyl 5 g/L (0,51% w/w)

Clopyralid 120 g/L (12,21% w/w)

Midlet indeholder reaktionsmasse af N,N-dimethyldecan-1-amid og N,N-dimethyloctanamid

Midlet er et emulgerbart koncentrat (emulsionskoncentrat).

Batch nr. og produktionsdato: Se pakningen

Holdbar minimum 2 år fra produktionsdato.

Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H,

1411 København K

Tlf. 45 28 08 00, www.corteva.dk

™Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies

NETTOINDHOLD: 3 LITER

Artwork Free area for
in-house print of
2D data matrix code



Teknisk information

Korvetto er et systemisk ukrudtsmiddel til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i vinterraps om foråret. Korvetto bekæmper bl.a. kornblomst, burresnerre, valmue og kamille.

Virkemåde

Korvetto indeholder auxindannerne halauxifen-methyl og clopyralid. Korvetto optages primært gennem ukrudtets blade. De første symptomer ses typisk fra få dage efter behandling. Sluteffekten ses fra 4-6 uger efter behandling.

Optimal effekt sikres ved at behandle på mindre ukrudtsplanter i en veletableret afgrøde.

Klimaforhold ved anvendelse

Korvetto kan anvendes når dagtemperaturen er over 10°C. Valmue, hvidmelet gåsefod, burresnerre og tvetand kan bekæmpes ved lavere temperaturer. Undgå behandling forud for frost.

Undgå at behandle når afgrøden er udsat for stress fra kulde, tørke, vandlidende jord, angreb af skadedyr, mangel på næringsstoffer osv.

Doserings- og anvendelsesvejledning

Maksimalt en behandling.

Korvetto eller andre produkter indeholdende clopyralid må kun anvendes hvert 4. år på samme areal.

Non-printed area on page 2 ONLY
(on the back of 2D code area printed
on the front page)

Afgrøde	BBCH	Dosering, l/ha	Effekt	
			85-94,9%	70-84,9%
Vinterraps	30-50 forår	0,65	Agertidse, burresnerre, kornblomst, lægejordrøg, mark-valmue, tornet salat og tvetand	Agergåseurt, alm. brand- bæger, hvidmelet gåsefod, kornvalmue, lugtløs kamille, vellugtende kamille og storkenæb

Bekæmpelse af storkenæb

Den bedste effekt mod storkenæb opnås, når der behandles mod små storkenæb i en konkurrencestærk afgrøde. Ved behandling mod store planter, på store bestande eller i afgrøder som yder svag konkurrence kan storkenæb genoptage væksten nogle uger efter behandling.

Jordtyper

Korvetto kan anvendes på alle jordtyper.

Regnfasthed

Korvetto er regnfast efter en time.

Omsåning

Ved omsåning kan der 30 dage efter behandling med Korvetto efter forudgående jordbehandling til mindst 20 cm etableres vårraps, vårbyg, vårhvede, havre, hør, majs, og græs.

Efterfølgende afgrøde

Følgende afgrøder er følsomme overfor Korvetto:

- kartoffel og andre arter af natskygge-familien
- ært, bønne, lupin, kløver og andre bælgeplanter
- gulerod og andre skærmblostmstrede arter
- salat, solsikke og andre kurvblomstmstrede arter

Plantemateriale fra en afgrøde, der er behandlet med Korvetto, som ikke er nedbrudt, kan skade en efterfølgende følsom afgrøde. Derfor bør der ikke etableres følsomme afgrøder før plantemateriale fra en behandlet afgrøde er nedbrudt. Husdyrgødning fra dyr, der er blevet fodret med afgrøder, der er behandlet med Korvetto, kan ligeledes skade følsomme afgrøder. Plantemateriale eller husdyrgødning, som indeholder rester fra Korvetto, må ikke anvendes i drivhuse, i kompost, eller som gødning i følsomme afgrøder.

Plantemateriale eller husdyrgødning, som indeholder rester fra Korvetto, må ikke anvendes til biogas.

Personlige værnemidler

I henhold til Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg foreslås følgende:

Ved opblanding: Anvend åndedrætsværn med halvmaske og filtertype A2P2, overtræksbukser eller forklæde, beskyttelsebriller, -handsker og -støvler.

Ved udsprøjtning: Med spredbom mindre end 1 meter over jordoverfladen monteret på traktor eller lign., samt ved arbejde udenfor førerhus anvendes overtræksbukser, handsker og støvler. Under ophold i lukket førerhus (ventilationsanlæg skal være slukket) skal der ikke anvendes særlige værnemidler. Ved andre udbringningsmetoder henvises til vejledning om personlige værnemidler fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg.

Sprøjteteknik og vandmængde

Korvetto skal udbringes med en marksprøjte, som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Udstyret skal indeholde præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.

Vandmængde er 100-300 l/ha. Anvend en sprøjteteknik som er tilpasset ukrudtets størrelse og bladstilling. Ved behandling i kraftige afgrøder og hvor der er behov for god nedtrængning, anbefales minimum 200 liter vand pr. hektar.

For at undgå risiko for afdrift, bør der ved behandling langs markskel og marker med følsomme afgrøder være særlig opmærksomhed på sprøjteteknik og vindforhold.

Eksempel på sprøjteteknik

Vand (l/ha)	Dyse	Tryk (bar)	Hastighed
100	Grøn – ISO 015 (lavdrift)	2,5	6,6 km/t
150	Gul – ISO 020 (lavdrift)	2,5	5,8 km/t
200	Lilla – ISO 025 (Lavdrift/fladspred)	2,5	5,5 km/t

Tilberedning af sprøjtevæske

Sørg altid for, at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr fyldes stationen halvt med vand, hvorefter der påfyldes den ønskede mængde produkt, som herefter suges op i sprøjtetanken samtidig med at rent vand tilsættes fyldestationen.

Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Korvetto i fyldestationen.

Direkte injektion: Der henvises til sprøjtefabrikantens anbefalinger.

Rengøring af sprøjteudstyr

Indvendig rengøring af sprøjteudstyr ved skift mellem/ afslutning af sprøjteopgave

Bemærk! Skyllevandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

Vær meget opmærksom på at få rengjort alle indvendige dele af sprøjten grundigt. Aktivér alle haner og ventiler samt hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. Dette gælder under alle rengøringsprocesser.

- Husk at tømme sprøjten helt inden rengøring. Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uden at den maksimale dosering overskrides.

- Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetank, slanger og bom straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet kan med fordel deles, så indvendig vask og udsprøjtning foregår af 2-3 gange.

- Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt 0,5 liter All Clear¹ Extra eller lignende produkt i anbefalet dosering pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem slanger, bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse

køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal f.eks. på marken under kørsel.

- Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 liter vand.
- Skyl tanken og alle slanger grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser.

Udvendig rengøring af sprøjteudstyr

Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.

Resistensstrategi

Produktnavn	Type	Aktivstof	HRACgruppe	Risiko for udvikling af resistens
Korvetto	HERBICID	Clopyralid	4	Lav
		Halauxifen-methyl	4	Lav

Corteva Agriscience anbefaler en stærk anti-resistens strategi. For at undgå resistensudvikling anbefaler Corteva Agriscience, at der anvendes ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet. Det anbefales endvidere at have både vår- og vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på at manglende effekt kan skyldes begyndende resistensudvikling.

Lagring

Opbevares tørt og frostfrit.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

Producentansvar

Producenten er ansvarlig for varens kvalitet og ensartethed. Producenten erklærer endvidere, at mid-

let under normale forhold, er rimeligt egnet til de i brugsanvisningen angivne formål. Producenten fralægger sig derimod ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet. Ved produktets effekt forstås både den utilsigtede eller manglende virkning produktet måtte have.

Corteva Agriscience Denmark A/S er medlem af Dansk Planteværn.

¹Varemærke – FMC Agricultural Solutions

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Kan forårsage langvarig og diffus forurening af vandressourcer (EUH450).

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud (EUH066).

Undgå indånding af spray (P261).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Bær øjenbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpålagte sikkerhedsdatablad.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps.

Brugsanvisningens angivelser skal overholdes.

Sprøjteførere skal anvende kemisk bestandige handsker ved blanding og påfyldning.

For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder clopyralid kun anvendes hvert 4. år på samme areal (SPe1).

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbi passerende.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Midlet må kun opbevares i originalemballagen.



Førstehjælp

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352)

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN eller en læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312)

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Forsæt skylning. Ring omgående til GIFTLINJEN eller en læge (P305+P351+P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313)



Korvetto™

Arylex™ active

UKRUDTSMIDDEL

GROUP

4

FUNGICIDE

UFI: PFN9-N0W6-X00X-XUX9

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Ukrudtsmiddel nr. 64-93

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse:

Halauxifen-methyl 5 g/L (0,51% w/w)

Clopyralid 120 g/L (12,21% w/w)

Midlet indeholder reaktionsmasse af N,N-dimethyldecan-1-amid og N,N-dimethyloctanamid

Midlet er et emulgerbart koncentrat (emulsionskoncentrat).

Batch nr. og produktionsdato: Se pakningen

Holdbar minimum 2 år fra produktionsdato.

**Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H,
1411 København K**

Tlf. 45 28 08 00, www.corteva.dk

™Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies

NETTOINDHOLD: 3 LITER



0299387

2603